

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie | Volumen 16 (2) | 2026/163-171

PRIMEROS REGISTROS DE NIDIFICACIÓN PARA SIETE ESPECIES DE AVES SILVESTRES DE SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA

First nesting records for seven species of wild birds in Santiago del Estero, Argentina

Oscar B. Quiroga^{1*}, Diego Cejas², Guadalupe Laitán^{3,4}, Carla Rueda^{4,3},
Marta Rueda⁴, Dante Loto³, Raúl Mansilla⁵, Gabriel Guzmán⁶, Ariel
Rojas⁵ y Edgar Rolando Achaval⁷

¹Dirección de Producción Agropecuaria y Políticas Ambientales, Municipalidad de La Banda. 25 de Mayo N° 461, (4300) La Banda, Santiago del Estero, Argentina. *oscarbquiroya@gmail.com

²La Plata N° 524, (4200) Ciudad Capital, Santiago del Estero, Argentina.

³Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Santiago del Estero. Av. Belgrano (S) N° 1912, (4200) Capital, Santiago del Estero, Argentina.

⁴Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero. Av. Belgrano (S) N° 1912, (4200) Capital, Santiago del Estero, Argentina.

⁵Asociación Civil de Pequeños Productores del Noroeste de Alberdi, (4301) Alberdi, Santiago del Estero, Argentina.

⁶Unión de Pequeños Productores del Salado Norte, (3745) Pozo del Castaño, Santiago del Estero, Argentina.

⁷Camino a San Esteban S/N, (4200) Santiago del Estero, Argentina.

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

Resumen. En este trabajo presentamos los primeros registros de nidificación del ñandú (*Rhea americana*), yerutí gris (*Leptotila verreauxi*), jote cabeza negra (*Coragyps atratus*), aguilucho colorado (*Buteogallus meridionalis*), chuña patas negras (*Chunga burmeisteri*), loro hablador (*Amazona aestiva*) y tacuarita azul (*Poliophtila dumicola*) en áreas de bosque chaqueño semiárido de Santiago del Estero. Datos que complementan el escaso conocimiento que todavía se tiene sobre la biología reproductiva de la avifauna del noroeste argentino. Estas siete especies son consideradas aves residentes y de amplia distribución en Santiago del Estero, donde aún no se contaba con menciones o registros de nidos documentados.

Palabras clave. Avifauna, Chaco semiárido, nidos, noroeste argentino.

Abstract. In this paper, we present the first nesting records of the greater rhea (*Rhea americana*), white-tipped dove (*Leptotila verreauxi*), black-headed vulture (*Coragyps atratus*), savanna hawk (*Buteogallus meridionalis*), black-legged seriema (*Chunga burmeisteri*), turquoise-fronted amazon (*Amazona aestiva*), and masked gnatcatcher (*Poliophtila dumicola*) in semi-arid Chaco forest areas of Santiago del Estero. This data complements the limited knowledge currently available on the reproductive biology of the avifauna of northwestern Argentina. These seven species are considered resident birds with a wide distribution in Santiago del Estero, where there were no previous mentions or records of documented nests.

Keywords. Birdlife, semi-arid Chaco, nests, northwest Argentina.

INTRODUCCIÓN

La reproducción de las aves silvestres de Argentina fue recopilada en compendios donde se exponen varios aspectos de la biología reproductiva de las aves, desde ciclo de nidificación, forma y tamaño de huevos, aspectos externos e internos de sus nidos y detalles de los pichones, documentados en varias de las provincias argentinas (Salvador, 2016; de la Peña, 2023a,b,c,d).

En la provincia de Santiago del Estero últimamente se documentó la nidificación de 24 especies de aves silvestres (Quiroga y Llugdar, 2019; Quiroga *et al.*, 2024), muchas de estas especies comunes y abundantes en la provincia (Coria *et al.*, 2021), donde probablemente ocupen un área reproductiva mayor a la observada.

En el presente trabajo damos a conocer datos de nidificación para siete especies de aves silvestres que habitan la provincia de Santiago del Estero, tomadas en las localidades de Zanjitas (26°42'12"S, 63°43'15"O, dpto. Jiménez), Tres Hermanos (26°12'17"S, 63°23'19"O, dpto. Copo), El Aibe (26°12'17"S, 63°23'20"O, dpto. Alberdi) y Pozo del Arbolito (27°38'54"S, 64°59'20"O, dpto. Río Hondo). Estos sitios pertenecen a la ecoregión del Chaco Semiárido con especies vegetales como quebracho blanco (*Aspidosperma quebracho-blanco*), quebracho colorado santiagueño (*Schinopsis lorentzii*), algarrobo blanco (*Neltuma alba*) y negro (*Neltuma nigra*), chañar (*Geoffroea decorticans*), mistol (*Sarcomphalus mistol*), vinal (*Neltuma ruscifolia*), mistol del zorro (*Castela coccinea*), tala (*Celtis tala*), atamisqui (*Atamisquia emarginata*), brea (*Parkinsonia praecox*), ancoche (*Vallisia glabra*), entre otras de menor porte.

Ñandú

Rhea americana

El ñandú es un rheido que habita praderas, cultivos, estepas, palmares, sabanas, y

bosques abiertos desde el norte de Argentina hasta Río Negro (de la Peña, 2023a). Su área reproductiva abarca las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Córdoba, San Luis, San Juan, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, donde existen registros reproductivos durante todo el año a excepción de mayo y junio (de la Peña, 2023a). Construye el nido sobre el suelo, formando una depresión o ligera excavación, colocando en la base pastos y/o plumas, a veces forma un reborde con estos elementos y tallos de yuyos y palitos, donde coloca entre 10 y 30 o más huevos, amarillentos cuando recién puestos y luego van tornándose blanquecinos (de la Peña, 2023a).

En un área abierta de Zanjitas, en octubre y noviembre, se observaron dos nidos ubicados sobre bases de arbustos de jume negro (*Allenrolfea vaginata*), elaborados con pequeñas ramas y pasto seco, cada uno contenía 12 y 16 huevos blancos, respectivamente. Actualmente este sitio fue invadido por arbustales de vinal, desplazando el arbustal de jumes y pastizal de gramíneas, lo que provocó el desplazamiento de los



Figura 1- Adulto, pichones y huevos taxidermizados de Ñandú (*Rhea americana*) en Museo de Ciencias Naturales de la Fauna Autóctona de Pinto, colectados el 3 de noviembre de 2019 en Bandera (C. Apóstol, *in litt.* 2026). Fotos: O. B. Quiroga.

ñandúes a zonas más lejanas. Otro registro de nido corresponde al 3 de noviembre de 2019 en Bandera (río Salado, dpto. Belgrano), donde algunos ejemplares (un adulto, dos huevos y tres pichones) fueron colectados y conservados taxidermizados en la colección biológica del Museo de Ciencias Naturales de la Fauna Autóctona de Pinto (dpto. Aguirre) (C. Apóstol, *in litt.* 2026) (Figura 1).

Yerutí gris

Leptotila verreauxi

La yerutí gris es un colúmbido que habita bosques, sabanas, selvas y selvas en galería desde el norte de Argentina hasta San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires (de la Peña, 2023b). Su área reproductiva abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, donde existen registros reproductivos durante todo el año a excepción de junio y julio (de la Peña, 2023b). El nido es una pataforma de palitos, semiexpuesta, colocada a baja y media altura en árboles, arbustos o enredaderas, elaborado con palitos finos, tallos de yuyos o enredaderas y hojas, internamente cubierto por fibras finas y pequeñas plumas, donde coloca dos huevos de color crema (de la Peña, 2023b).

El 11 de diciembre de 2024 a las 11:00 hs observamos un adulto posado sobre un nido en Pozo del Arbolito, éste era una plataforma de ramas finas sostenido por ramas terciarias de una enredadera (*Mikania* sp.) entrelazadas con ramas primarias de un pequeño mistol, ubicado a 2,35 m del suelo (Figura 2A). No registramos el contenido de este nido pero sí la presencia de una serpiente (*Boiruna maculata*) adulta predándolo al día siguiente. Otro nido fue




Figura 2- Nidos de Yerutí gris (*Leptotila verreauxi*) en Pozo del Arbolito ubicados A) en una enredadera (*Mikania* sp.) el 11 de diciembre de 2024, y B) entre un ancoche (*Vallesia glabra*) y una tala (*Celtis tala*), el 15 de diciembre de 2024. Fotos: O. B. Quiroga.

descubierto en la misma localidad el 15 de diciembre de 2024 a las 9:58hs, ubicado entre tronco y ramas primarias de ancoche y tronco de tala, con forma de una semitaza, elaborado con finas ramas, algo traslúcido, situado a 2,67 m del suelo. En este último observamos un adulto salir volando del nido vacío, por lo que presumimos que la postura estaba próxima. (Figura 2B).

Jote cabeza negra

Coragyps atratus

El jote cabeza negra es un cathártido que habita montes y bosques abiertos, selvas, sabanas, praderas y estepas arbustivas, e incursiona en basurales y mataderos en

áreas rurales, en gran parte del territorio argentino, excepto en Tierra del Fuego (de la Peña, 2023c). Su área reproductiva abarca las provincias de Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, San Juan, Mendoza, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Chubut, en donde la temporada reproductiva se extiende de julio a diciembre (de la Peña, 2023c). Nidifica en cuevas en rocas, en nidos abandonados de loro barranquero (*Cyanoliseus patagonus*), en huecos de árboles o directamente en el suelo. En el nido rudimentario, oculto o semioculto por matorrales, coloca sobre el suelo de dos a tres huevos de coloración variable (blanquecino, crema, grisáceo, celeste o verdoso pálido) en el fondo con manchas castañas, violáceas, pardas o negruzcas y pintas grises, a veces

las manchas concentradas en el polo mayor (de la Peña, 2023c).

Un nido fue observado en un hueco en la base ancha de un quebracho colorado santiagueño (*Schinopsis lorentzii*) en Tres Hermanos. Otro nido fue hallado en Zanjitas en el hueco de un árbol seco, quebrado, en una zona abierta de jumes negros rodeada con algunos vinales, contenía dos pichones cubiertos con plumón blanco; en esta zona suelen reproducirse entre diciembre y enero.

Aguilucho colorado

Buteogallus meridionalis

El aguilucho colorado es un accipítrido que habita praderas arboladas, sabanas y



Figura 3- Adulto de Aguilucho colorado (*Buteogallus meridionalis*) posado en nido en un quebracho blanco (*Aspidosperma quebracho-blanco*) seco en Zanjitas, el 21 de noviembre de 2023. Fotos: O. B. Quiroga.

orillas de montes, generalmente cercano al agua, en las provincias del norte y centro de Argentina (de la Peña, 2023c). Su área reproductiva abarca las provincias de Jujuy, Tucumán, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Corrientes y Córdoba, en donde la temporada reproductiva se extiende de septiembre a enero (de la Peña, 2023c). El nido es una plataforma expuesta elaborada externamente con palitos e internamente con pajitas, situada en árboles altos o postes de alta tensión, donde coloca un huevo blanco inmaculado o con pintas y manchas rojizas y pardas (de la Peña, 2023c).

En 21 de noviembre de 2023 en Zanjitas observamos un adulto echado en un nido ubicado a 9 m sobre ramas terciarias de un quebracho blanco seco, era una pataforma elaborada de ramas delgadas con espinas. Al transitar por las cercanías del nido, aproximadamente 50 m, el adulto se mantuvo parado con actitud de alerta (atento, vigilando) (Figura 3).

Chuña patas negras

Chunga burmeisteri

La chuña patas negras es un cariámido que habita sabanas y montes en las provincias del norte y centro de Argentina (de la Peña, 2023c). Su área reproductiva abarca las provincias de Salta, Catamarca, Córdoba, Chaco y La Pampa, en donde la temporada reproductiva se extiende de septiembre a diciembre (de la Peña, 2023c). El nido es una plataforma expuesta elaborada externamente con palitos e internamente con pajitas, situada en árboles o en arbustos, donde coloca dos huevos de color crema con pintas y manchas castañas y grises, espaciadas (de la Peña, 2023c).

En Pozo del Arbolito registramos tres nidos en forma de plataforma algo cóncava, los dos primeros elaborados con ramas y ubicados a 5,5 m en un mistol (año 2022)

y a 6 m en un algarrobo negro (año 2023). El 2 de diciembre de 2025 registramos un tercer nido ubicado a 5,40 m entre ramas secundarias de un mistol; se trataba de una plataforma elaborada de ramas espinosas cubiertas con líquenes y pequeños claveles del aire (*Tillandsia* sp.), e internamente recubierta por excremento triturado de bovino, sus medidas eran: 62 cm de diámetro externo, 31 cm de diámetro interno, 10,5 cm de profundidad; contenía dos huevos color crema con pintas castañas mayormente concentradas en el polo mayor y dispuestas en dos capas superpuestas, sus medidas fueron: 600 x 436 mm, 612 x 444 mm (Figura 4). Los tres nidos fueron descubiertos al salir adultos volando de éstos, en los dos primeros presumimos que podrían




Figura 4- Nido de Chuña patas negras (*Chunga burmeisteri*) en un mistol (*Sarcomphalus mistol*) en Pozo del Arbolito, el 2 de diciembre de 2025, mostrando detalles A) de la estructura del nido y B) sus dos huevos. Fotos: E. R. Achaval

estar incubando huevos o cubriendo pichones de corta edad.

Loro hablador

Amazona aestiva

El loro hablador es un psitácido que habita naturalmente sabanas, bosques y selvas en las provincias del norte argentino, existiendo además registros para Buenos Aires y Mendoza (de la Peña, 2023c). Su área reproductiva abarca las provincias de Jujuy, Formosa, Chaco, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, en donde la temporada reproductiva se extiende de septiembre a diciembre (de la Peña, 2023c). Generalmente

para nidificar suele utilizar huecos en árboles donde coloca de dos a seis huevos blancos (de la Peña, 2023c).

En la zona de El Aibe estos loros nidifican durante el verano en huecos de quebracho colorado santiagueño, quebracho blanco, guayacán (*Libidiba paraguariensis*) y vinal; en la zona existe la creencia popular que los pichones con mayor porcentaje de color amarillo en el rostro provienen de nidos elaborados en estas últimas dos especies vegetales, en cambio, los que presentan mayor proporción de color celeste provienen de nidos elaborados en los dos quebrachos. En Tres Hermanos en 2023 se observó una pareja ocupando un hueco de grandes carpinteros de la zona (ej.: *Campephilus leu-*



Figura 5- Nido de Loro hablador (*Amazona aestiva*) mostrando los detalles de la entrada (flecha roja) en un quebracho blanco (*Aspidosperma quebracho-blanco*) en Tres Hermanos. Fotos: O. B. Quiroga.

copogon, *Dryocopus schulzi*) elaborado en la rama primaria de un quebracho blanco, a una altura de 6 m, con la entrada orientada hacia el este (Figura 5).

Tacuarita azul

Polioptila dumicola

La tacuarita azul es un polioptílido que habita sabanas, arboledas y bosques desde el norte de Argentina hasta Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba, La Pampa, Río Negro y Neuquén (de la Peña, 2023d). Su área reproductiva abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Formosa, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Neuquén, en donde la temporada reproductiva se extiende de septiembre a febrero (de la Peña, 2023d). El nido es expuesto y tiene forma de tacita, asentado y atado en las ramas, construido con fibras vegetales, cubierto externamente con líquenes, a veces con ootecas, trozos de corteza y musgos liados con telarañas, e internamente con cerdas o pequeñas plumas. Allí coloca tres, raramente cuatro, huevos blancos con tinte verdoso o celeste verdoso con pintas y manchitas castañas o pardo-rojizas distribuidas por toda la superficie, aunque más abundantes en el polo mayor (de la Peña, 2023d).

El 19 de octubre de 2022 a las 15:20 hs en Pozo del Arbolito observamos una hembra adulta entrando y saliendo de un nido, moldeando el interior con su vientre (Figura 6). Este nido, expuesto y camuflado, estaba situado a 4 m del suelo entre tres ramas secundarias de una tala, recubierto externamente por líquenes, trocitos de corteza y sacos de huevos de arañas, todo entrelazado con telarañas.

Estas siete especies de aves silvestres son consideradas residentes y de amplia distribución en Santiago del Estero, excepto *A. aestiva* que solamente ocupa la porción

norte (Coria *et al.*, 2021). A pesar de habitar gran parte del territorio, hasta la actualidad no existían reportes de nidificación en esta provincia, a excepción de una mención del nido de *L. verreauxi*, donde no se brindan detalles de fecha, sitio ni contenido del mismo (Salvador y Salvador en Salvador, 2016). Nuestros datos representan los primeros registros de nidificación para estas siete especies en Santiago del Estero (Salvador, 2016; Coria *et al.*, 2021; de la Peña, 2023a,b,c,d). Los aportes sobre la reproducción de estas especies contribuyen al conocimiento de estos territorios. A su vez, se destaca que la participación de las comunidades locales en estos escenarios y procesos de investigación son fundamentales para continuar profundizando en el conocimiento de la biodiversidad.




Figura 6- Nido de Tacuarita azul (*Polioptila dumicola*) con **A)** hembra adulta ingresando al nido, y **B)** detalle de la estructura del nido, en Pozo del Arbolito el 19 de octubre de 2022. Fotos: O. B. Quiroga.

AGRADECIMIENTOS

A las comunidades campesinas de Tres Hermanos, Zanjitas y El Aibe, por su apoyo y el aporte sobre conocimientos locales de la fauna silvestre en sus sistemas productivos. Al Proyecto “Biodiversidad en paisajes de bosque nativo bajo sistemas de ganadería y plantaciones de algarrobo del Chaco argentino, Argentina”. The World Bank – INTA contrato N°7207773. A la M.Sc. Natalia G. Fracassi E.E.A. Delta del Paraná, CRBAN. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Al Proyecto de Investigación “Evaluación de los Servicios Ecosistémicos en socioecosistemas del Chaco Seco. Una aproximación metodológica multicriterio -23/B169” FCF-UNSE. A Celestina Apóstol por su aporte desde el Museo de Ciencias Naturales de la Fauna Autóctona de Pinto.

BIBLIOGRAFÍA

- Coria, O. R., Quiroga, O. B., Navarro, J. L., Heredia, J., Torres, R., Lima, J. (2021). Lista actualizada de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana*, 65 (1), 42-143.
- de la Peña, M. R. (2023a). Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino*, Nueva Serie, 1, 1-297.
- de la Peña, M. R. (2023b). Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino*, Nueva Serie, 2, 1-177.
- de la Peña, M. R. (2023c). Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino*, Nueva Serie, 7, 1-588.
- de la Peña, M. R. (2023d). Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino*, Nueva Serie, 10, 1-168.
- Quiroga, O. B., Llugdar, J. E. (2019). Primeros registros de nidificación para veintiuna especies de aves en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. *EcoRegistros Revista*, 9, 28-40.
- Quiroga, O. B., Laitán, M. G., Rueda, C. V., Rueda, M. P., Loto, D., Gómez, Y. D., Mansilla, R. (2024). Primeros registros de nidificación para tres especies de aves silvestres en Santiago del Estero, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana*, 68 (1), 149-157.
- Salvador, S. A. (2016). *Distribución reproductiva de las aves de Argentina y sus territorios*. Recopilación inédita. Córdoba, Argentina: Edición del Autor.